TRAMMISSIONE MATERNO-INFANTILE DELL'HIV

Efficacia del programma di
prevenzione in Burundi

Dott.ssa Valentina Libanore

Dott. Roberto Rostagno

Malattie Infettive

Università degli Studi di Torino

Université de Ngozi

Comitato
Collaborazione
Medica

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO
ALMA UNIVERSITAS
TAURINENSIS

AIDS

La *sindrome da immunodeficienza acquisita*, o AIDS, rappresenta lo stadio più avanzato di una malattia causata da un retrovirus, il virus dell'immunodeficienza umana (*human immunodeficiency virus*) o HIV.

Storia dell'AIDS

1981 5 casi di polmonite da *Pneumocystis carinii*

1981-1982 casi di Sarcoma di Kaposi

Giugno 1982 GRID (Gay Related ImmunoDeficiency)

Agosto 1982 CDC introduce il termine AIDS

1983 in USA 22.996 casi di AIDS, 12.592 morti.

Maggio 1983 LAV Montagnier

Maggio 1984 HTLV-III Gallo

Maggio 1986 **HIV**

ORIGINE HIV

Adattamento di un virus animale che colpisce le scimmie (**SIV**, **Simian Immunodeficiency Virus**), che ha cominciato a diffondersi tra gli scimpanzè circa 5000 anni fa .

Anni 30: inizio della diffusione alla specie umana per contaminazione con il sangue delle scimmie (cacciatori).

Kinshasa, RDC

Primi casi documentati di infezione:

- **1959** donatore asintomatico - Kinshasa
- **1966** marinaio norvegese di 32 anni
- **1968** ragazzo di 15 anni - St.Louis (USA)
- **1979** tre giovani tossicodipendenti ricoverati per epatite acuta - Milano

ORIGINE HIV

HIV-1 *Pan troglodytes troglodytes*

HIV-2 *Cercocebus atys atys*

TRASMISSIONE

Sessuale

Parenterale (attraverso il sangue)

TRASMISSIONE

Verticale (da madre a figlio)

TERAPIA E SOPRAVVIVENZA

Prima della terapia antiretrovirale: in media 19 mesi

1987 **AZT** (zidovudina)

1996 **HAART** (*highly active antiretroviral therapy*)

NO CURA
NO VACCINO

GLOBAL REPORT

Global estimates for adults and children | 2009

People living with HIV	33.3 million [31.4 million – 35.3 million]
New HIV infections in 2009	2.6 million [2.3 million – 2.8 million]
Deaths due to AIDS in 2009	1.8 million [1.6 million – 2.1 million]

Over 7000 new HIV infections a day in 2009

STATO ATTUALE PANDEMIA

STATO ATTUALE PANDEMIA

GLOBAL REPORT

**2009 global HIV and AIDS estimates
Children (<15 years)**

Children living with HIV	2.5 million [1.6 million – 3.4 million]
New HIV infections in 2009	370 000 [230 000 – 510 000]
Deaths due to AIDS in 2009	260 000 [150 000 – 360 000]

GLOBAL REPORT

Children (<15 years) estimated to be living with HIV | 2009

Total: 2.5 million [1.6 million – 3.4 million]

Trasmissione Materno-Infantile

- Gravidanza
- Travaglio
- Allattamento al seno

26% (1 neonato su 4)

Profilassi Trasmissione Materno-Infantile

- Profilassi farmacologica gravidanza e travaglio
- Parto cesareo elettivo
- Profilassi farmacologica al neonato
- Latte artificiale

2%

COUNTDOWN TO ZERO

Believe it.
Do it.

1. Ridurre nuove infezioni da HIV nei bambini del 90%

2. Ridurre la mortalità materna per AIDS del 50%.

GLOBAL PLAN TOWARDS THE ELIMINATION OF NEW HIV INFECTIONS
AMONG CHILDREN BY 2015 AND KEEPING THEIR MOTHERS ALIVE

2011-2015

Prevenzione: ridurre l'incidenza di HIV nelle donne

Believe it.
Do it.

Pianificazione familiare donne HIV+

Ridurre la trasmissione HIV madre-figlio

Cura e assistenza alle donne HIV+ per tutta la vita

Piemonte e Burundi

STESSA SUPERFICIE

km²

Piemonte e Burundi

25402

4.457.335

POPOLAZIONE

ab.

27830

8.303.000

Piemonte e Burundi

NATALITÀ
(per 1000 ab.)

nati

Piemonte e Burundi

ETÀ MEDIA

anni

Piemonte e Burundi

km²

ab.

nati

anni

RIASSUNTIVA

Piemonte e Burundi

0,18

%

PREVALENZA HIV

3,3

Piemonte e Burundi

PERSONE VIVENTI HIV+

Piemonte e Burundi

CASI DI TRASMISSIONE

MADRE-FIGLIO

0,18
6.000

3,3

10 in 30 anni

n

5000 in un anno

Piemonte e Burundi

Premessa allo studio

- Grande numero di parti (283.000 parti all'anno)
- Alta prevalenza di allattamento al seno (45% latte materno esclusivo <6 mesi)
- Ogni anno giungono al parto circa 15.000 donne che vivono con l'HIV

Premessa allo studio

Il programma PTME in Burundi **inizio nel 2000** nel sito pilota di Buyenzi.

Il Ministero della Salute del Burundi, in collaborazione con UNICEF, CED-Caritas, FHI e altri partner, dal 2002 programma finalizzato all'accesso universale a prevenzione e cura dell'infezione da HIV. Da allora il programma PMTCT aumento del numero di siti. **Nel 2009 vi erano 119 siti**

In linea con le raccomandazioni dell'OMS 2010 la profilassi antiretrovirale consigliata in Burundi prevede associazione di **tre farmaci dalle 14 settimane di gravidanza**, fino alla settimana successiva all'interruzione dell'allattamento al seno.

Viene incoraggiato l'allattamento artificiale soltanto laddove siano soddisfatti i **criteri AFASS** (Acceptable, accettabile; Feasible, attuabile; Affordable, conveniente; Sustainable, sostenibile; Safe, sicuro); in caso contrario viene consigliato l'allattamento materno esclusivo per i primi 6 mesi di vita, Il neonato dovrebbe ricevere quotidianamente un farmaco antiretrovirale per le prime 6 settimane di vita.

In Burundi, **92% delle donne** effettua una visita prenatale almeno una volta durante la gravidanza, Il **40% delle donne** incinte effettua il test HIV durante la gravidanza e, di quelle che risultano sieropositive, solamente il **12% riceve la terapia** per la PTME dato che si discosta molto dall'obiettivo stabilito dal Global Plan 2011 (copertura del 90%)

Lo studio

- La PTMI funziona nei Paesi “ricchi”
- In Burundi la PTMI è poco efficace
 - Quali risorse abbiamo per valutarla?
 - Qual è l’anello debole?

I nostri strumenti

Sopravvivenza senza HIV

- Valuta la sopravvivenza del bambino a 2 anni e quindi la mortalità da qualsiasi causa
- Valuta l'infezione da HIV del bambino a 2 anni

Copertura intervento PTMI

- È un surrogato dell'indicatore "infezioni prevenute del bambino"
- Meno costoso quindi applicabile su larga scala

L'anello debole

- Tutti i passaggi **solo nel 15-30%** dei casi nei Paesi ad alta endemia

Serie di eventi necessari perché una donna incinta riceva la profilassi ARV in maniera completa

Come abbiamo fatto?

- Tutte le puerpere ricoverate in Ginecologia
- Tutte le donne HIV in età fertile
- Questionari
- Cartelle cliniche

Conoscenze sull'HIV
Pianificazione familiare
Utilizzo servizi prenatali
Opinioni su terapia e
allattamento

Dove?

Che cosa abbiamo osservato?

- Intervistate 846 donne (508 in Ginecologia)
- Età tra i 16 e i 50 anni
- Tasso di rifiuto 13%

Ginecologia

- L'età mediana era di 24 anni
- Era la terza o quarta gravidanza
- A Cibitoke livello di “istruzione primaria”, a Kiremba “non alfabetizzata”
- Coltivatrici (15000 vs 5000 FBU)

Donne HIV

- Maggiore età mediana (33 anni)
- Quasi la metà erano separate o vedove
 - Diversi impieghi (7000 vs 3000 FBU)
 - Maggior numero di *partner* nella vita

Eseguito il test HIV?

Mancanza di reattivi
Motivi di ordine
economico e
culturale

Offerto il *pacchetto prevenzione*

Conclusioni?

- Focalizzare la ricerca
- Popolazione che vive nella comunità
- Studio prospettico (sangue cordonale, PCR ai bambini)

Comitato di
Collaborazione Medica
Università di Ngozi
Università di Torino
Comune di Volpiano
Comune di San Benigno
Canavese
Regione Piemonte

Bukebuke
bushikana umusiba
ku mugezi

Poco a poco
il bruco raggiunge
il torrente